

Ueber das Verhalten des Orbita-Index bei den verschiedenen Refraktionszuständen vom 10. bis 19. Lebensjahr.

(Aus der Augenklinik von Dr. Leopold Weiss.)

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

unter dem Präsidium des

Herrn Professor Dr. von Rothmund

Vorstand der kgl. Augenklinik

der hohen medizinischen Facultät

der kgl. Ludwigs-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

ALFRED NATHAN BAER

appr. Arzt aus Mannheim.

MÜNCHEN

Buchdruckerei von J. B. GRASSL, Goethestrasse 12.

1889

Ueber das Verhalten der Orbita bei den verschiedenen Refraktionszuständen.

(Aus der Augenklinik von Dr. Leopold Weiss.)

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

unter dem Präsidium des

Herrn Professor Dr. von Rothmund

Vorstand der kgl. Augenklinik

der hohen medizinischen Facultät

der kgl. Ludwigs-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

ALFRED NATHAN BAER

appr. Arzt aus Mannheim.

MÜNCHEN

Buchdruckerei von J. B. GRASSL, Goethestrasse 12.

Meinem lieben Onkel

Herrn Rabbiner Dr. Alexander Stein in Worms

in dankbarer Verehrung gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41548319_0095

Von Stilling¹⁾ ist in jüngster Zeit behauptet worden, dass bei den Myopen der Orbitaeingang absolut und relativ niedriger gefunden werde, als bei Emmetropen und Hypermetropen. Er glaubt in diesem, angeblich charakteristischen Verhalten, eine Stütze für seine Theorie²⁾ gefunden zu haben, nach welcher die Entstehung der Myopie im wesentlichen als ein modificiertes Wachstum des Auges unter Muskeldruck während der Zeit des grössten Körperwachstums aufzufassen sei, wobei dem *Musculus obliquus superior* eine ganz besondere Bedeutung zukomme. Bei der Naharbeit, insbesondere beim Lesen und Schreiben kommen hauptsächlich, einmal die der Convergenz vorstehenden Interni in Betracht, und ferner, da bei der Naharbeit die Blickebene stets mehr oder weniger geneigt ist, die Abwärtswender des Auges, das sind der *Rectus inferior* und der *Obliquus superior*. „Von den vier beim Lesen und Schreiben thätigen Muskeln — sagt Stilling³⁾ — werden die beiden *Recti laterales* am wenigsten angestrengt. Zwar sind ihre Contractionen fortwährend in Anspruch genommen, aber sie lösen sich doch immerhin sehr häufig, wenn auch nur für wenige Momente“ — (beim Hin- und Hergehen des Auges

1) Stilling, Schädelbau und Kurzsichtigkeit, eine anthropol. Untersuchung. 1888.

2) Bericht über die XVIII. Versammlung der ophthalmolog. Gesellschaft. Heidelberg 1886. S. 15.

3) Stilling, Untersuchung über Entstehung der Kurzsichtigkeit 1888. S. 11.

beim Lesen einer Zeile) — „gegenseitig ab. Im Gegensatz zu den Rr. lat. sind der Rectus inferior und der obliquus superior in fortwährender Spannung.“ Der Verlauf des Obliquus superior wird nun sehr verschieden gefunden, und je nach dem Verlauf soll der Muskel bald mehr eine Zerrung am Auge, bald mehr einen Druck auf dasselbe verursachen können. Der Druck, den der Obliquus bei seiner Contraction auf das Auge ausübt, wird dann am grössten sein, wenn der Muskel den Bulbus in grosser Ausdehnung umschlingt. Es ist das dann der Fall, wenn die Trochlea tief liegt, dies ist im allgemeinen dann, wenn der Orbitaeingang niedrig ist; und das soll nach Stilling bei Myopen das gewöhnliche Verhalten sein.

Theoretisch scheint die Sache soweit ganz einleuchtend. Es soll auch von vornherein nicht die Möglichkeit eines derartigen Einflusses inabrede gestellt werden. Die Hauptsache ist und bleibt aber denn doch: Sind in der That die anatomischen Verhältnisse so, dass sie unzweideutig für die Stilling'sche Ansicht sprechen?

Gleich nach dem Erscheinen von Stilling's Arbeit hat Weiss in den klinischen Monatsblättern*) in einer kurzen Mitteilung Bedenken gegen die Richtigkeit der Stilling'schen Anschauung geäussert, die sich vorzugsweise auf die Befunde der Untersuchung einer grösseren Reihe von Anisometropen stützten. Ist die Höhe des Orbitaeinganges — so argumentirt Weiss — wirklich von so hervorragender Bedeutung für die Entstehung der Myopie, so wird man von vornherein erwarten dürfen, bei Anisometropen, welche durch angestrengte Nah-Arbeit auf dem einen Auge myopisch geworden sind, auf der Seite des myopisch gewordenen Auges den Orbitaeingang niedriger zu finden, als auf der anderen Seite. Dem ist aber nicht so. Die Untersuchungen bei Anisometropen ergaben fast immer einen nahezu gleichhohen Orbitaeingang beiderseits. In einigen Fällen wurde sogar auf der Seite des myopisch gewordenen

*) Kl. Mtsbl. für Augenheilkunde. Sept. 1888.

Auges der Orbitaeingang gerade im Gegenteil höher gefunden, als auf der Seite des Auges mit niederer Refraktion.

In der Discussion, die sich an Stilling's Vortrag über Schädelbau und Kurzsichtigkeit auf dem Ophthalmologencongress zu Heidelberg anschloss, bemerkte Schmidt-Rimpler, dass er bei seinen Schuluntersuchungen, die sich allerdings auf ein relativ kleines Material beschränkten, eine Bestätigung der Stilling'schen Angaben nicht gefunden habe.

Unter solchen Umständen schien es angezeigt, durch ausgedehntere Untersuchungen den Gegenstand einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen, umsomehr, als nach den wenigen Angaben der Lehrbücher darüber zu urteilen, abgesehen von Stilling-Cohen'schen, nicht sehr viele derartige Messungen vorzuliegen scheinen.

Durch das freundliche Entgegenkommen der Direction des grossherzoglichen Gymnasiums in Mannheim bot sich hierzu eine gute Gelegenheit.

Ehe nun das Ergebniss der Untersuchung mitgeteilt wird, sei vorausgeschickt, in welcher Weise die Untersuchungen vorgenommen wurden. Zunächst sei bemerkt, dass die Schüler nicht im Gymnasium selbst untersucht wurden. An jedem Tage kamen je 10 resp. 12 in das Sprechzimmer des Herrn Dr. Weiss; auf deren Untersuchung wurden im allgemeinen ca. 2 Stunden verwendet. Der Gang der Untersuchung war folgender:

Nach Messung der Pupillendistanz mit dem Weiss'schen — oder wie er auch genannt wird — dem Weiss-Landolt'schen Doppelmaassstab, wurden die Schädel und Gesichtsmaasse mit einem gewöhnlichen Tasterzirkel genommen und der Kopfumfang mittelst eines Conformatours, wie ihn die Hutmacher benützen, aufgezeichnet. Die Orbitalmaasse wurden mit einem eigens zu diesem Zwecke construierten kleinen Tasterzirkel festgestellt, dessen Branchen, ähnlich wie bei dem von Stilling

gebrauchten, in zwei kleine Plättchen ausliefen, die sich ein wenig unter die Orbitalränder schieben liessen. Die gefundenen Maasse wurden sofort notiert. Nicht unerwähnt sei noch, dass bei einer Anzahl von Schülern der unteren Klassen die Maasse der Orbita mit dem von Weiss bei seinen früheren Messungen benützten Zirkel genommen wurden, dessen Spitzen mit zwei kleinen Kügelchen armiert sind. Nachdem dann die Muskelverhältnisse für Ferne und Nähe durch den Prismenversuch geprüft waren, wurde mittelst des Augenspiegels, zum Teil unter Anwendung von Cocain die Refraktion bestimmt, und dann zum Schluss die subjektive Refraktionsbestimmung vorgenommen. In einer Reihe von Fällen wurden die Messungen mehrfach wiederholt. Von vornherein wurde in Aussicht genommen, nach einem oder zwei Jahren dieselben Schüler wieder zu untersuchen, um zu constatiren, bei welchen die Refraktion in höherem Grade zugenommen hat.

Bei diesem Gange der Untersuchung war dem Untersuchenden zur Zeit der Orbitamessung der Refraktionszustand des Auges völlig unbekannt, der Einfluss einer vorgefassten Meinung auf die Messung somit völlig ausgeschlossen.

Grund der ausführlichen Mitteilung des Untersuchungsmodus ist auch der, dass daraus ersichtlich ist, wie die Refraktion in jedem einzelnen Falle auch mit der selbstverständlich nothwendigen Genauigkeit bestimmt wurde. Bei den Stilling-Cohen'schen Untersuchungen ist in vielen Fällen auf diesen Punkt offenbar nicht die nothwendige Sorgfalt verwendet worden. Imbetreff der Angaben über die Refraktion sagt Stilling*): dass zum Teil die als kurzsichtig aufgeführt wurden, die den Lehrern als Myopen bekannt waren und Konkavbrillen trugen, zum Teil die Angaben auf einer „in den letzten Jahren“ von anderer Seite aufgeführten Refraktionsbestimmung basieren. Im ersteren Falle blieben offenbar eine Reihe von Myopen mit geringgradiger Myopie und Schüler

*) Stilling, Schädelbau und Kurzsichtigkeit. S. 16.

mit einseitiger Myopie unberücksichtigt: Es wurden dieselben hauptsächlich den Emmetropen beigerechnet. Und auch im anderen Falle wurde eine Fehlerquelle eingeführt, da es nicht zulässig ist, das Ergebniss einer vor Jahren vorgenommenen Refraktionsbestimmung bei einer späteren Untersuchung zu verwenden, weil erfahrungsgemäss gerade in den Entwicklungsjahren während der Schulzeit die Refraktion im allgemeinen von Jahr zu Jahr zunimmt.

Ueber das Gesamtergebniss der in dieser Weise ausgeführten Untersuchung wird Herr Dr. Weiss an anderem Orte ausführlich berichten. Für vorliegende Arbeit hat Verfasser nur einen Punkt herausgegriffen und zum Gegenstand der ausführlichen Behandlung gemacht.

Es soll nämlich bei den verschiedenen Refraktionszuständen untersucht werden: Das Verhalten des Orbita-Einganges, ausgedrückt durch das Verhältniss der Höhe zur Breite. (= Orbitaindex.)

Bevor ich dazu übergehe, das Ergebniss in Tabellen geordnet mitzuteilen, erübrigt noch zu bemerken, dass die gefundenen Messungswerte, wie das auch von Stilling*) hervorgehoben wird, der Natur der Sache nach keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit erheben können, indem die Hautdecken über den Orbitalrändern ja individuell verschieden dick sind, und auch beim sorgfältigsten Messen sich kleine Fehler nicht vermeiden lassen. Auch darin muss man mit Stilling**) übereinstimmen, dass die sich ergebenden Unterschiede gross sein müssen, wenn sie etwas beweisen sollen.

Der Inhalt der jetzt folgenden Tabellen, die sich auf die einzelnen Klassen beziehen, ist aus den Ueberschriften klar ersichtlich.

Bei der kleinen Zahl von Myopen in den unteren Klassen kann den hier gefundenen Mittelwerten keine allzu grosse

*) Stilling, Schädelbau u. Kurzsichtigkeit. S. 6.

**) l. c. S. 6.

Bedeutung beigelegt werden. Auch imbetreff der Zusammenstellung der Mittelwerte der Orbitalindices von sämtlichen myopischen Augen, welche am Schluss mit denen der anderen Refraktionszustände übersichtlich in der mit III bezeichneten Tabelle aufgeführt ist, muss bemerkt werden, dass hier besondere Verhältnisse berücksichtigt werden müssen, die weiter unten ihre Besprechung finden sollen.

In Tabelle I und II sind diese Durchschnittswerte bei den verschiedenen Refraktionszuständen klassenweise zusammengestellt.

TABELLEN.

Sexta.

Hypermetropie.

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite · 100) = Orbitaindex	Refraktion
1	9 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$	34	92,6	H 1,5
2	10 $\frac{1}{2}$	32	33 $\frac{1}{2}$	95,5	H 1,5
3	10 $\frac{1}{2}$	31	33	93,9	H 1,5
4	9 $\frac{1}{2}$	32	33	97,0	H 1,0

Emmetropie.

5	10 $\frac{1}{2}$	33	33	100,0	H—E
6	10 $\frac{1}{2}$	32	34	94,1	H—E
7	10	34	33 $\frac{1}{2}$	101,4	H—E
8	10	31	34 $\frac{1}{2}$	89,9	H—E
9	8 $\frac{3}{4}$	30	33	90,9	H—E
10	9 $\frac{3}{4}$	31	34	91,2	H—E
11	9 $\frac{1}{2}$	30	32 $\frac{1}{2}$	92,3	H—E
12	10	33	33 $\frac{1}{2}$	98,5	E
13	10	31	34	91,2	E
14	8 $\frac{3}{4}$	30 $\frac{1}{2}$	33	92,4	E
15	9 $\frac{3}{4}$	31	34 $\frac{1}{2}$	89,9	E
16	9 $\frac{1}{2}$	30	32 $\frac{1}{2}$	92,3	E
17	9 $\frac{1}{2}$	33	32 $\frac{1}{2}$	101,2	E
18	9 $\frac{1}{2}$	32	33 $\frac{1}{2}$	95,5	E
19	10 $\frac{1}{2}$	31	36	86,1	E
20	10 $\frac{1}{2}$	31	36	86,1	E
21	9 $\frac{1}{2}$	33	33 $\frac{1}{2}$	98,5	E
22	9 $\frac{1}{2}$	32	33 $\frac{1}{2}$	95,5	E
23	9 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$	87,3	E
24	9 $\frac{1}{2}$	26 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$	84,1	E
25	9 $\frac{1}{4}$	32	33	97,0	E
26	9 $\frac{1}{4}$	32	32	100,0	E
27	9	32	33	97,0	E
28	9	32 $\frac{1}{2}$	33	98,5	E
29	10	36	34 $\frac{1}{2}$	104,4	E
30	10	35	34	102,9	E
31	9	30 $\frac{1}{2}$	34	89,7	E

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) = Orbitaindex	Refraktion
32	9	29	34	85,3	E
33	9 ¹ / ₄	30 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	88,4	E
34	9 ¹ / ₄	30	34 ¹ / ₂	87,0	E
35	9	30 ¹ / ₂	35	87,1	E
36	9	30 ¹ / ₂	35 ¹ / ₂	85,9	E
37	9 ¹ / ₃	32	33	97,0	E
38	9 ¹ / ₃	31	32	96,9	E
39	9	33	33	100,0	E
40	9	32	32	100,0	E
41	9	32 ¹ / ₂	32	101,6	E
42	9	33	34	97,1	E
43	9 ¹ / ₄	29	34	85,3	E—(M)
44	9 ¹ / ₄	29	34 ¹ / ₂	84,1	E—(M)
45	9	31	32	96,9	E—M
46	11	33	35 ¹ / ₂	93,0	E—M
47	9	35	35	100,0	E—M
48	9	34	35	97,1	E—M
49	11	32	32 ¹ / ₂	98,5	E—M
50	11	32	32 ¹ / ₂	98,5	E—M
51	9	30	34	88,2	E—M
52	9	30	34	88,2	E—M
53	10	32	33	97,0	E—M
54	10	32	32 ¹ / ₂	98,5	E—M

Myopie.

55	10	35	32 ¹ / ₂	107,7	M 1,0
56	10	34	32 ¹ / ₂	104,6	M 1,0
57	9 ³ / ₄	32	33	97,0	M 1,5
58	9 ³ / ₄	31	32	96,9	M 1,5
59	10 ¹ / ₂	32	32 ¹ / ₂	98,5	M 2,0
60	10 ¹ / ₂	30	32	93,8	M 2,0
Gesamtmittel . . .		31,6	33,4	94,6	
Mittel d. Hypermetropen		31,6	33,4	94,6	
Mittel der Emmetropen		31,5	33,6	94,0	
Mittel der Myopen . .		32,3	32,4	99,8	

Quinta.

Hypermetropie.

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) = Orbitaindex	Refraktion
1	12	32	33 ¹ / ₂	95,5	H 4,5
2	10 ¹ / ₂	31	33	93,9	H 4,5
3	12	32	33 ¹ / ₂	95,5	H 4,0
4	10 ¹ / ₂	32	34	94,1	H 2,0
5	10 ¹ / ₂	32	32 ¹ / ₂	98,5	H 2,0
6	10	32	35	90,1	H 2,0
7	10 ¹ / ₂	32	32 ¹ / ₂	98,5	H 1,5
8	10	33	31 ¹ / ₂	104,8	H 1,5
9	10	35	34	102,9	H 1,5
10	10 ¹ / ₄	32 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	97,0	H 1,5
11	10	32	34 ¹ / ₂	94,1	H 1,25
12	10	33	31 ¹ / ₂	104,8	H 1,25
13	10	33 ¹ / ₂	34	98,5	H 1,0
14	10 ¹ / ₄	32	33 ¹ / ₂	95,6	H 1,0
15	11	35 ¹ / ₂	35	101,4	H 1,0
16	10 ¹ / ₂	32	33	97,0	H 1,0

Emmetropie.

17	11 ¹ / ₂	31	34	91,2	H—E
18	11 ¹ / ₂	30 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	91,0	H—E
19	11	33 ¹ / ₂	33	101,5	H—E
20	11	32 ¹ / ₂	33	98,5	H—E
21	10 ¹ / ₂	32	34	94,1	H—E
22	10 ¹ / ₂	31 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	94,1	H—E
23	11	32	30	106,7	H—E
24	11	31	31 ¹ / ₂	98,3	H—E
25	10	33	33 ¹ / ₂	98,5	H—E
26	10	33 ¹ / ₂	34	98,5	H—E
27	9	33	34	97,1	H—E
28	9	33	33 ¹ / ₂	98,5	H—E
29	10 ¹ / ₄	34	33 ¹ / ₂	101,5	H—E
30	10 ¹ / ₂	35	35	100,0	H—E
31	10	32 ¹ / ₂	33	95,5	H—E
32	9	33	35	94,3	H—E

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) = Orbitaindex	Refraktion
33	$10^{1/2}$	33	35	94,3	H—E
34	11	$36^{1/2}$	$35^{1/2}$	102,8	E
35	$10^{1/4}$	35	34	102,9	E
36	$10^{1/2}$	$34^{1/2}$	36	95,8	E
37	10	$32^{1/2}$	34	95,6	E
38	11	32	33	97,0	E
39	11	31	33	94,0	E
40	10	$31^{1/2}$	33	95,5	E
41	10	31	32	96,9	E
42	10	32	34	94,1	E
43	10	32	34	94,1	E
44	10	32	$32^{1/2}$	98,5	E
45	10	$31^{1/2}$	$32^{1/2}$	96,9	E
46	10	33	$32^{1/2}$	101,5	E
47	10	35	34	102,9	E
48	11	30	33	90,9	E
49	11	29	33	87,7	E
50	10	34	$33^{1/2}$	101,5	E
51	10	$33^{1/2}$	33	101,5	E
52	11	$30^{1/2}$	31	98,4	E
53	11	$30^{1/2}$	31	98,4	E
54	10	35	$35^{1/2}$	98,6	E
55	10	35	$35^{1/2}$	98,6	E
56	10	30	32	93,8	E
57	10	$30^{1/2}$	32	95,3	E
58	$10^{1/2}$	33	$32^{1/2}$	101,5	E
59	$10^{1/2}$	33	$33^{1/2}$	98,6	E
60	11	30	33	90,9	E
61	11	29	33	87,7	E
62	$9^{1/4}$	30	$31^{1/2}$	95,2	E
63	$10^{3/4}$	31	34	91,2	E
64	10	33	$31^{1/2}$	104,8	E
65	9	$33^{1/2}$	35	95,7	E—M
66	10	32	32	100,0	E—M
67	$10^{3/4}$	31	34	91,2	E—M
68	$9^{1/4}$	$29^{1/2}$	32	92,2	E—M
69	10	29	$33^{1/2}$	86,6	E—M
70	10	$28^{1/2}$	32	89,1	E—M
71	10	30	35	85,7	E N

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) = Orbitaindex	Refraktion
72	10	30	34	88,2	E—M
73	10 ¹ / ₂	31 ¹ / ₂	32	98,4	E—M
74	10 ¹ / ₂	31 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂	96,9	E—M
75	10 ¹ / ₂	34	34 ¹ / ₂	98,6	E—M
Myopie.					
76	10 ¹ / ₂	34	34	100,0	M 1,0
77	10 ³ / ₄	31 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂	96,9	M 1 0
78	10 ³ / ₄	30 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂	93,8	M 1,0
79	10 ¹ / ₄	33	34 ¹ / ₂	95,7	M 2,5
80	10 ¹ / ₄	33	34 ¹ / ₂	95,7	M 2,5
Gesamtmittel . . .		32,2	33,3	96,5	
Mittel d. Hypermetropen		32,6	33,4	97,6	
Mittel der Emmetropen		32,1	33,3	96,4	
Mittel der Myopen . .		32,4	33,6	96,4	

Quarta. Hypermetropie.

1	13 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	36	93,1	H 2,75
2	13 ¹ / ₂	34	36	94,4	H 1,75
3	11	32	32 ¹ / ₂	98,5	H 1,5
4	11	32	34	94,1	H 1,25
5	11	32	33	97,0	H 1,25
6	11	31 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂	96,9	H 1,0
7	12	32 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	97,0	H 1,0
8	12	32 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	97,0	H 1,0
9	13 ¹ / ₄	33	37	89,4	H 1,0
10	13 ¹ / ₄	33	36	91,7	H 1,0
11	11	33	32	103,1	H 1,0
12	11	32 ¹ / ₂	32	101,6	H 1,0
13	11	33 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	97,1	H 1,0
14	11	33 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	100,0	H 1,0
15	11 ¹ / ₂	31	31	100,0	H 1,0
16	11 ¹ / ₂	31	31	100,0	H 1,0
17	12 ¹ / ₂	31	31	95,4	H 1,0

Emmetropie.

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) = Orbitaindex	Refraktion
18	11 ¹ / ₂	30 ¹ / ₂	35	87,1	H—E
19	11 ¹ / ₂	30 ¹ / ₂	35	87,1	H—E
20	11 ¹ / ₂	30	35	85,7	H—E
21	11 ¹ / ₄	32	35	91,4	H—E
22	12 ¹ / ₄	34 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	100,0	H—E
23	12 ³ / ₄	35	34	102,9	H—E
24	12 ¹ / ₂	31	32 ¹ / ₂	95,4	H—E
25	12 ³ / ₄	35	34	102,9	E
26	12 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	100,0	E
27	11 ¹ / ₂	30	34 ¹ / ₂	87,0	E
28	11	32 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	97,0	E
29	11	32 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	97,0	E
30	11	32	32 ¹ / ₂	98,5	E
31	11	31	33	93,9	E
32	11	32	35 ¹ / ₂	90,1	E
33	11	32	35	91,4	E
34	11	31	35	88,6	E
35	11	31	34 ¹ / ₂	89,9	E
36	12	33 ¹ / ₂	36 ¹ / ₂	91,8	E
37	12	33	37	89,2	E
38	11 ¹ / ₂	33	37 ¹ / ₂	88,0	E
39	11 ¹ / ₂	33	37 ¹ / ₂	88,0	E
40	11 ¹ / ₂	34	34	100,0	E
41	11 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	34	98,5	E
42	12 ¹ / ₂	33	33 ¹ / ₂	98,5	E
43	12 ¹ / ₂	33	34	97,1	E
44	12 ³ / ₄	33 ¹ / ₂	33	101,5	E
45	12 ¹ / ₂	33	34	97,5	E
46	12	30 ¹ / ₂	34	89,7	E
47	11	31	35	88,6	E
48	12 ³ / ₄	30	33	90,9	E
49	12 ³ / ₄	30	33	90,9	E—(M)
50	12 ³ / ₄	32	33	96,9	E—(M)
51	11 ¹ / ₄	32	34	94,1	E—M
52	11	31	35	88,6	E—M
53	12	31 ¹ / ₂	35	90,0	E—M
54	13 ¹ / ₂	30 ¹ / ₂	34	89,7	E—M

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) — Orbitalindex	Refraktion
55	13 ¹ / ₂	30	34	88,2	E—M
56	11 ¹ / ₂	33	34	97,1	E—M
57	11 ¹ / ₂	31 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	94,1	E—M
58	11	33	35 ¹ / ₂	93,0	E—M

Myopie.

59	12 ¹ / ₂	34	34	100,0	M 1,0
60	11	32 ¹ / ₂	35 ¹ / ₂	91,6	M 1,5
Gesamtmittel . . .		32,2	34,2	94,4	
Mittel d. Hypermetropen		32,4	33,5	96,8	
Mittel der Emmetropen		32,1	34,4	93,3	
Mittel der Myopen . .		33,3	34,8	95,8	

Unter-Tertia.

Hypermetropie.

1	12 ³ / ₄	33	35	94,3	H 4,5
2	12 ³ / ₄	31 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	94,0	H 4,0
3	13 ¹ / ₄	30	30	100,0	H 3,0
4	14 ¹ / ₄	35	33 ¹ / ₂	104,5	H 3,0
5	13 ¹ / ₄	30	30	100,0	H 2,0
6	11 ³ / ₄	30	32	93,8	H 1,5
7	11 ³ / ₄	30	31	96,8	H 1,5
8	14 ¹ / ₄	32 ¹ / ₂	35	92,9	H 1,0
9	12 ¹ / ₂	30	32 ¹ / ₂	92,3	H 1,0
10	12 ¹ / ₂	29	33	84,9	H 1,0
11	12 ¹ / ₄	33	32	103,1	H 1,0
12	11 ¹ / ₂	32	34	94,1	H 1,0
13	13 ¹ / ₄	30	31	96,8	H 1,0

Emmetropie.

14	12 ¹ / ₄	32 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	97,0	H—E
15	11 ¹ / ₂	30 ¹ / ₂	33	92,4	H—E
16	13 ¹ / ₄	28 ¹ / ₂	30 ¹ / ₂	93,4	H—E

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) Orbitaindex	Refraktion
17	13 ¹ / ₄	28	31	90,3	H - E
18	12 ¹ / ₄	29 ¹ / ₂	31	95,2	H - E
19	11 ¹ / ₂	31 ¹ / ₂	32	98,4	H - E
20	14	36	33	109,1	H - E
21	13 ¹ / ₄	35	33	106,1	H - E
22	13	29 ¹ / ₂	32	92,2	H - E
23	13 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂	32	101,6	(H) - E
24	13 ¹ / ₂	30 ¹ / ₂	32	95,3	(H) - E
25	14	28 ¹ / ₂	33	86,4	(H) - E
26	13 ¹ / ₄	30	30	100,0	E
27	14	28 ¹ / ₂	34	83,8	E
28	13	31	32	96,7	E
29	13 ¹ / ₄	35	32 ¹ / ₂	107,7	E
30	14	35	33	106,1	E
31	11 ¹ / ₂	32	32	100,0	E
32	12 ¹ / ₄	30	31 ¹ / ₂	95,2	E
33	13 ¹ / ₂	33	33	100,0	E
34	13 ¹ / ₂	33	33	100,0	E
35	12 ³ / ₄	30	31	96,8	E
36	12 ³ / ₄	29	30	96,7	E
37	13	33	29	113,8	E
38	13	31 ¹ / ₂	29	108,6	E
39	12 ¹ / ₄	27	31 ¹ / ₂	85,7	E
40	12 ¹ / ₄	27	31	87,1	E
41	12 ¹ / ₂	31 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	94,0	E
42	12 ¹ / ₂	30 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	91,0	E
43	14 ¹ / ₂	35	33 ¹ / ₂	104,5	E
44	14 ¹ / ₂	34	33	103,0	E
45	13 ¹ / ₂	32	31 ¹ / ₂	101,6	E
46	13 ¹ / ₂	31 ¹ / ₂	32	98,4	E
47	12 ¹ / ₄	28	33 ¹ / ₂	83,6	E
48	12 ¹ / ₄	28 ¹ / ₂	34	83,8	E
49	12	32	32	100,0	E
50	12	32	31	103,2	E
51	13 ¹ / ₄	32	34	94,1	E
52	13 ¹ / ₄	32	33 ¹ / ₂	95,5	E
53	12 ¹ / ₄	31 ¹ / ₂	34	92,6	E
54	12 ¹ / ₄	31	34	91,2	E
55	13 ¹ / ₄	33	31	106,5	E

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) = Orbitaindex	Refraktion
56	12 ¹ / ₄	33	33 ¹ / ₂	98,5	E
57	13 ¹ / ₄	32 ¹ / ₂	31	104,8	E—M
58	12 ¹ / ₄	29 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	88,1	E—M
59	12 ³ / ₄	34	33 ¹ / ₂	101,5	E—M
60	12 ³ / ₄	33	34	97,1	E—M
61	13	31 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	94,0	E—M
62	13	31 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	94,0	E—M
63	12 ¹ / ₂	30 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂	93,8	E—M
64	12 ¹ / ₂	30 ¹ / ₂	33	92,4	E—M
65	12 ¹ / ₂	33	32	103,1	E—M
66	12 ¹ / ₂	31 ¹ / ₂	32	98,4	E—M
67	12	31 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂	106,2	E—M
68	12	33 ¹ / ₂	33	101,5	E—M
69	13 ¹ / ₂	31	31	100,0	E—M
70	13 ¹ / ₂	29 ¹ / ₂	30	98,8	E—M
71	11 ³ / ₄	32	31 ¹ / ₂	101,6	E—M
72	11 ³ / ₄	30	30	100,0	E—M

Myopie.

73	11 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	31	111,3	M 1,0
74	11 ¹ / ₂	33	31	106,5	M 1,0
75	12 ¹ / ₄	33	31	106,5	M 1,75
76	12 ¹ / ₄	30 ¹ / ₂	30	101,7	M 1,25
77	11 ³ / ₄	34	33	103,0	M 5,0
78	11 ³ / ₄	33 ¹ / ₂	32	104,7	M 6,0
Gesamtmittel		31,5	32,2	97,9	
Mittel d. Hypermetropen		31,2	32,5	96,2	
Mittel der Emmetropen		31,4	32,3	97,5	
Mittel der Myopen		33,1	31,3	105,6	

Ober-Tertia. Hypermetropie.

1	14	31 ¹ / ₂	32	98,4	H 1,5
2	15	30	31	96,8	H 1,5
3	13 ³ / ₄	31	31 ¹ / ₂	98,4	H 1,5

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) = Orbitaindex	Refraktion
4	15	35 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	102,9	H 1,25
5	14	31	33	93,9	H 1,0
6	15	29	31 $\frac{1}{2}$	92,1	H 1,0
7	13 $\frac{3}{4}$	31	30	103,3	H 1,0
8	14	30 $\frac{1}{2}$	31	98,4	H 1,0

Emmetropie.

9	15	34	33 $\frac{1}{2}$	101,5	H—E
10	14 $\frac{3}{4}$	33	34	97,1	H—E
11	13	32	32	100,0	H—E
12	14	31 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$	96,9	H—E
13	14	31	32 $\frac{1}{2}$	95,4	E
14	13	31	32	96,9	E
15	14 $\frac{3}{4}$	33	34	97,1	E
16	13	31 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$	100,0	E
17	13	31	31 $\frac{1}{2}$	98,4	E
18	13	30	32	93,8	E
19	13	30	32 $\frac{1}{2}$	92,3	E
20	14 $\frac{1}{2}$	33	33	100,0	E
21	14 $\frac{1}{2}$	33	33 $\frac{1}{2}$	98,5	E
22	13 $\frac{3}{4}$	30	33	90,9	E
23	13 $\frac{3}{4}$	30	34	88,2	E
24	15	29 $\frac{1}{2}$	30	98,3	E
25	15	29	31	93,6	E
26	13	30 $\frac{1}{2}$	32	95,3	E
27	13	30	31	96,8	E
28	15	31 $\frac{1}{2}$	34	92,6	E
29	15	32	34	94,1	E
30	13 $\frac{1}{2}$	32	33	97,0	E
31	13 $\frac{1}{2}$	31	32	96,9	E
32	14 $\frac{1}{2}$	32	34	94,1	E
33	15 $\frac{1}{4}$	30	34	88,2	E
34	13 $\frac{1}{3}$	32	31	103,2	E
35	14 $\frac{1}{2}$	31	33 $\frac{1}{2}$	92,5	E
36	14 $\frac{1}{2}$	32	32	100,0	E
37	13	31	33 $\frac{1}{2}$	92,5	E
38	15	33 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	100,0	E
39	15 $\frac{1}{4}$	31	34	91,2	E—M

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) — Orbitaindex	Refraktion
40	14 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$	33	98,5	E - M
41	13 $\frac{1}{3}$	34	31 $\frac{1}{2}$	107,9	E—M
42	14 $\frac{1}{2}$	32	33	97,0	E - M
43	14 $\frac{1}{2}$	31	32	96,9	E - M
44	13	31	33 $\frac{1}{2}$	92,5	E—M
45	15	34	33 $\frac{1}{2}$	101,4	E—M
46	13 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	100,0	E—M
47	13 $\frac{1}{2}$	32	33	97,0	E—M
48	13 $\frac{1}{2}$	31	32	96,9	E - M
49	14 $\frac{1}{2}$	30	31 $\frac{1}{2}$	95,2	E - M
50	14 $\frac{1}{2}$	31	31	100,0	E - M
51	15 $\frac{3}{4}$	34	33	103,0	E—M
52	15 $\frac{3}{4}$	34	33	103,0	E M

Myopie.

53	13 $\frac{1}{4}$	33 $\frac{1}{2}$	33	101,5	M 1,0
54	12 $\frac{1}{4}$	28	31	90,3	M 1,0
55	14 $\frac{1}{4}$	31 $\frac{1}{2}$	32	98,4	M 1,25
56	14 $\frac{1}{4}$	34	31	109,7	M 1,5
57	14 $\frac{1}{4}$	27 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$	87,3	M 1,5
58	14 $\frac{1}{4}$	27 $\frac{1}{2}$	31	88,7	M 1,5
59	13 $\frac{1}{2}$	34	34	100,0	M 1,0
60	13 $\frac{1}{2}$	34	34	100,0	M 1,0
Gesamtmittel . . .		31,5	32,5	97,0	
Mittel d. Hypermetropen		31,1	31,8	98,0	
Mittel der Emmetropen		31,6	32,7	96,9	
Mittel der Myopen . .		31,3	32,3	97,0	

Unter-Secunda. Hypermetropie.

1	16 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{3}$	35	92,9	H 1,5
2	15 $\frac{3}{4}$	29	33 $\frac{1}{2}$	86,9	H 1,5
3	16 $\frac{1}{2}$	33	35	94,3	H 1,0
4	15 $\frac{3}{4}$	30	33	90,9	H 1,0

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) = Orbitaindex	Refraktion
5	15	31	31 $\frac{1}{2}$	98,4	H 1,0
6	14 $\frac{1}{2}$	29	32	90,6	H 1,0
7	14	31	34	91,2	H 1,0

Emmetropie.

8	14	31	34	91,2	H—E
9	14 $\frac{1}{2}$	29	32	90,6	H—E
10	15	30 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$	100,0	H—E
11	15 $\frac{1}{4}$	33 $\frac{1}{2}$	34	98,5	H—E
12	15 $\frac{1}{4}$	33 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	100,0	H—E
13	14 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	35	95,7	H—E
14	14 $\frac{1}{4}$	30	32	93,8	H—E
15	15 $\frac{3}{4}$	30	34	88,2	H—E
16	16 $\frac{1}{4}$	32	34	94,1	H—E
17	17 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	37	93,2	(H)—E
18	14 $\frac{1}{2}$	35	36	97,2	E
19	14 $\frac{1}{4}$	30 $\frac{1}{2}$	31	98,4	E
20	15 $\frac{3}{4}$	30	34 $\frac{1}{2}$	86,9	E
21	16 $\frac{1}{4}$	32 $\frac{1}{2}$	34	95,6	E
22	17 $\frac{1}{2}$	35	38	92,1	E
23	15 $\frac{3}{4}$	30	34 $\frac{1}{2}$	87,0	E
24	15 $\frac{3}{4}$	30	34	88,3	E
25	14 $\frac{1}{4}$	31 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	91,3	E
26	14 $\frac{1}{4}$	31	35	88,6	E
27	15 $\frac{3}{4}$	35	35 $\frac{1}{2}$	98,6	E
28	15 $\frac{3}{4}$	33 $\frac{1}{2}$	36	93,1	E
29	15 $\frac{3}{4}$	31 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	94,0	E
30	15 $\frac{3}{4}$	31	33	93,9	E
31	14 $\frac{3}{4}$	32 $\frac{1}{2}$	33	98,2	E
32	14 $\frac{3}{4}$	32 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	97,0	E
33	15 $\frac{1}{2}$	32	34 $\frac{1}{2}$	92,8	E
34	15 $\frac{1}{2}$	31	35	88,0	E
35	15 $\frac{1}{4}$	31	33	93,9	E
36	15 $\frac{1}{4}$	30 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	91,0	E
37	15 $\frac{1}{4}$	30	34	88,2	E
38	15 $\frac{1}{4}$	30	34	88,2	E
39	15 $\frac{1}{2}$	30	34 $\frac{1}{2}$	87,0	E—M
40	15 $\frac{1}{2}$	29	34	85,3	E—M

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite (100) Orbitaindex	Refraktion
41	15	29	31	93,6	E—M
42	15	28	32	87,5	E—M
43	16	33 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	97,1	E—M
44	16	33	34 ¹ / ₂	95,7	E—M
45	14 ¹ / ₂	28 ¹ / ₂	35	81,4	E—M
46	14 ¹ / ₂	28	35	80,0	E—M
47	16 ¹ / ₄	32 ¹ / ₂	34	95,6	E—M
48	16 ¹ / ₄	31	34 ¹ / ₂	89,8	E—M
49	14 ¹ / ₂	33	34 ¹ / ₂	95,7	E—M
50	14 ¹ / ₂	32	35	91,4	E—M

Myopie.

51	14 ³ / ₄	34 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	100,0	H 1,0
52	14 ³ / ₄	34	34 ¹ / ₂	98,6	H 1,0
53	15 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	35	95,7	M 1,75
54	15 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	35	95,7	M 1,75
55	13 ¹ / ₂	33	34	97,1	M 2,0
56	13 ¹ / ₂	33	34	97,1	M 2,0
57	14	34	33 ¹ / ₂	101,5	M 2,0
58	14	34	35 ¹ / ₂	101,5	M 2,0
59	17 ¹ / ₄	37	37	100,0	M 4,0
60	17 ¹ / ₄	36	37	97,3	M 4,0

Gesamtmittel . . .	31,8	34,1	93,3	
Mittel d. Hypermetropen	30,8	33,4	92,2	
Mittel der Emmetropen	31,4	34,1	92,3	
Mittel der Myopen . .	34,3	34,5	98,5	

Ober-Secunda.

Hypermetropie.

1	15 ¹ / ₂	35	37	94,6	H 1,5
2	15 ¹ / ₂	38	38	100,0	H 1,25
3	15 ¹ / ₂	37	38	97,4	H 1,25
4	17 ¹ / ₄	31 ¹ / ₂	32	98,4	H 1,25

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite 100 = Orbitaindex	Refraktion
5	15 ³ / ₄	30 ¹ / ₂	36	84,7	H 1,25
6	15 ¹ / ₂	34	36	94,4	H 1,0
7	16 ³ / ₄	31	34 ¹ / ₂	89,9	H 1,0
8	17	34 ¹ / ₂	35	98,6	H 1,0

Emmetropie.

9	17	33 ¹ / ₂	35	95,7	H—E
10	15 ³ / ₄	31	36	86,1	H—E
11	16 ³ / ₄	30	34 ¹ / ₂	87,0	H—E
12	15	30	34	88,2	H—E
13	16 ¹ / ₄	35	35 ¹ / ₂	98,6	H—E
14	16 ¹ / ₄	35	35	100,0	H—E
15	14 ³ / ₄	30	35	85,7	H—E
16	16 ¹ / ₂	32	35	91,4	H—E
17	15 ¹ / ₂	36	36	100,0	H—E
18	16 ¹ / ₂	32	35	91,4	E
19	14 ³ / ₄	31	34	91,2	E
20	17 ³ / ₄	32	33	97,0	E
21	15 ¹ / ₂	32	32	100,0	E
22	15 ¹ / ₂	31	32 ¹ / ₂	95,4	E
23	14 ¹ / ₂	35 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	105,9	E
24	14 ¹ / ₂	35	34	102,9	E
25	16	31	34	91,2	E
26	16	28	34	82,4	E
27	15 ³ / ₄	29	33	87,9	E
28	15 ³ / ₄	29	33	87,9	E
29	14 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	35	98,6	E
30	14 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	35	95,7	E
31	15 ¹ / ₂	33	35	94,3	E
32	16 ¹ / ₄	31 ¹ / ₂	35 ¹ / ₂	88,7	E
33	15 ³ / ₄	31 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	91,3	E
34	18	30	34	88,2	E
35	15 ¹ / ₄	31	35	88,6	E
36	15 ³ / ₄	34	34 ¹ / ₂	98,6	E
37	15 ³ / ₄	33 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	97,1	E
38	15 ¹ / ₄	30	34	88,2	E—M
39	16 ¹ / ₄	31	38	81,6	E—M
40	16 ¹ / ₄	32 ¹ / ₂	36	90,3	E—M

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite 100 = Orbitaindex	Refraktion
41	15 ³ / ₄	30	34	88,2	E—M
42	15 ³ / ₄	37	32	86,5	E—M
43	15 ¹ / ₄	33	33 ¹ / ₂	98,5	E—M
44	15 ¹ / ₄	31 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	94,0	E—M
45	16	34	34	100,0	E—M

Myopie.

46	16	33	34 ¹ / ₂	95,7	M 1,0
47	17 ¹ / ₂	33	35	94,3	M 1,0
48	15 ¹ / ₂	37	35	105,7	M 1,0
49	18	31	34	91,2	M 1,5
50	15 ³ / ₄	32	36	88,9	M 2,0
51	15	29	34	85,3	M 2,0
52	15 ¹ / ₂	35 ¹ / ₂	36	98,6	M 2,5
53	15 ¹ / ₂	35 ¹ / ₂	36	98,6	M 2,0
54	15 ¹ / ₂	34	34 ¹ / ₂	98,6	M 2,0
55	15 ¹ / ₂	33 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂	97,1	M 2,0
56	16 ¹ / ₄	31 ¹ / ₂	37	85,1	M 4,5
57	18	35	37	94,6	M 7,0
58	18	33	37	89,2	M 7,0
59	16 ³ / ₄	32 ¹ / ₂	36	90,3	M 7,0
60	16 ³ / ₄	30	36	83,3	M 7,0

Gesamtmittel . . .	32,6	34,9	93,3	
Mittel d. Hypermetropen	33,9	35,8	94,7	
Mittel der Emmetropen	32,1	34,4	93,1	
Mittel der Myopen . .	33,0	35,5	93,1	

Unter-Prima.

Hypermetropie.

1	17 ¹ / ₂	35	37 ¹ / ₂	93,3	H 1,25
2	17 ¹ / ₂	34	37 ¹ / ₂	90,7	H 1,25
3	16 ¹ / ₄	33	36 ¹ / ₂	90,4	H 1,0

Emmetropie.

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite 100 — Orbitaindex	Refraktion
4	16 $\frac{1}{4}$	35	35	100,0	H—E
5	16	35	35 $\frac{1}{2}$	98,6	H—E
6	16	35	34 $\frac{1}{2}$	101,4	H—E
7	16 $\frac{1}{2}$	34	38	89,5	H—E
8	16 $\frac{1}{2}$	32	36 $\frac{1}{2}$	87,7	H—E
9	17 $\frac{3}{4}$	32	35	91,4	H—E
10	17 $\frac{3}{4}$	30 $\frac{1}{2}$	34	89,7	H—E
11	16 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$	33	92,4	H—E
12	16 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$	33	92,4	H—E
13	16 $\frac{3}{4}$	29	35 $\frac{1}{2}$	81,7	H—E
14	18 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$	89,0	E
15	17 $\frac{3}{4}$	33	36 $\frac{1}{2}$	90,4	E
16	16	31	34	91,2	E—(M)
17	16	31	35	93,9	E—(M)
18	16 $\frac{3}{4}$	29	34	85,3	E—M
19	18 $\frac{1}{2}$	32	36 $\frac{1}{2}$	87,6	E—M
20	17 $\frac{3}{4}$	33	36 $\frac{1}{2}$	90,4	E—M
21	16 $\frac{1}{4}$	35 $\frac{1}{2}$	40	88,8	E—M
22	16 $\frac{1}{4}$	35	38	92,1	E—M
23	17	30	34	88,2	E—M
24	16 $\frac{1}{2}$	33	38	86,8	E—M
25	16 $\frac{1}{2}$	33	37	89,2	E—M
26	19	30 $\frac{1}{2}$	35	87,1	E—M
27	19	30 $\frac{1}{2}$	36	84,7	E—M
28	17 $\frac{1}{4}$	32	36 $\frac{1}{2}$	87,7	E—M
29	17 $\frac{1}{4}$	33	35	94,6	E—M
30	16	30	34	88,2	E—M
31	16	29 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	85,5	E—M
32	20 $\frac{3}{4}$	32 $\frac{1}{2}$	34	95,6	E—M
33	17	34	37	91,9	E—M
34	19 $\frac{1}{4}$	28 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	82,6	E—M

Myopie.

35	17	34 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$	92,0	M 1,0
36	20 $\frac{3}{4}$	32	34	94,1	M 1,0
37	18 $\frac{1}{2}$	35	35 $\frac{1}{2}$	98,6	M 1,0
38	18 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	35	95,7	M 1,0
39	19	34	37	91,9	M 1,0

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite 100 == Orbitaindex	Refraktion
40	18	35	38	92,1	M 1,25
41	17 $\frac{1}{4}$	32	32 $\frac{1}{2}$	98,5	M 1,25
42	17 $\frac{1}{4}$	33 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	100,0	M 1,5
43	19 $\frac{1}{4}$	28	35 $\frac{1}{2}$	78,9	M 1,5
44	18	32	36	88,9	M 1,5
45	18	31	34	91,2	M 1,5
46	16	33	39 $\frac{1}{2}$	83,5	M 2,0
47	18	33	36	91,7	M 2,5
48	18	31 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$	88,7	M 2,5
49	18	30 $\frac{1}{2}$	35	87,1	M 2,5
50	17	31 $\frac{1}{2}$	34	92,6	M 2,5
51	16 $\frac{1}{2}$	34	36	94,4	M 4,0
52	16 $\frac{1}{2}$	35	37	94,6	M 4,5
53	16 $\frac{1}{4}$	33 $\frac{1}{2}$	39	85,9	M 4,5
54	18	31	36	86,1	M 5,0
55	18	32	35	91,4	M 5,0
56	18	32	33 $\frac{1}{2}$	95,5	M 6,0
57	16 $\frac{1}{2}$	31	36	86,1	M 3,0
58	16 $\frac{1}{2}$	30	36	83,3	M 6,0
59	16 $\frac{1}{2}$	31	33 $\frac{1}{2}$	92,5	M 8,0
60	16 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	91,0	M 8,0
Gesamtmittel . . .		32,2	35,6	90,6	
Mittel d. Hypermetropen		34,0	37,2	91,5	
Mittel der Emmetropen		32,0	35,5	90,2	
Mittel der Myopen . .		32,3	35,5	91,0	

Ober-Prima. Hypermetropie.

1	17 $\frac{3}{4}$	30 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	88,4	H 3,0
Emmetropie.					
2	17 $\frac{1}{2}$	30	34	88,2	H—E
3	17 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$	34	89,7	H—E
4	17 $\frac{1}{4}$	31	35 $\frac{1}{2}$	87,3	H—E

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältnisse von Orbitahöhe zu Orbitabreite 100 = Orbitaindex	Refraktion
5	19 $\frac{1}{4}$	32	36 $\frac{1}{2}$	87,7	E
6	17 $\frac{1}{4}$	32	35	91,4	E
7	16 $\frac{3}{4}$	33 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	97,1	E
8	16 $\frac{1}{4}$	33	34 $\frac{1}{2}$	95,7	E
9	17	31	36 $\frac{1}{2}$	84,9	E
10	17	31 $\frac{1}{2}$	37	85,1	E
11	17 $\frac{1}{2}$	28	36	77,8	E—M
12	17 $\frac{1}{2}$	28	37	75,7	E—M
13	18 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	37	90,5	E—M
14	19 $\frac{1}{4}$	32	36 $\frac{1}{2}$	87,7	E—M
15	17	32 $\frac{1}{2}$	37	87,9	E—M
16	18 $\frac{1}{2}$	32	36	88,9	E—M
17	17 $\frac{1}{2}$	30	34 $\frac{1}{2}$	87,0	E—M
18	18 $\frac{1}{2}$	31	35	88,6	E—M
19	18 $\frac{1}{2}$	31	35	88,6	E—M
20	18 $\frac{1}{2}$	34	35	97,1	E—M
21	18 $\frac{1}{2}$	32	34 $\frac{1}{2}$	92,8	E—M
22	19 $\frac{1}{4}$	29 $\frac{1}{2}$	35	84,3	E—M
23	19 $\frac{1}{4}$	28 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$	80,3	E—M
24	19	29	35	83,0	E—M
25	19	28	34	82,4	E—M
26	17	32	37	86,5	E—M
27	17 $\frac{3}{4}$	30	34	88,2	E—M
28	18	34 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$	92,0	E—M
29	20 $\frac{3}{4}$	34 $\frac{1}{2}$	38	90,8	E—M

Myopie.

30	19	34	35	97,2	M 1,0
31	19	34	35	97,2	M 1,0
32	17 $\frac{3}{4}$	28	34	82,4	M 1,25
33	17 $\frac{1}{4}$	35 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	102,9	M 1,5
34	17 $\frac{1}{4}$	36	34 $\frac{1}{2}$	104,3	M 2,0
35	20 $\frac{3}{4}$	35 $\frac{1}{2}$	39	90,8	M 2,0
36	17 $\frac{1}{2}$	25	34	74,1	M 2,0
37	18 $\frac{3}{4}$	31 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	91,3	M 2,0
38	19 $\frac{1}{2}$	30	35	85,7	M 2,0
39	18 $\frac{1}{4}$	33 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$	87,0	M 2,25
40	20	32	35	91,4	M 2,25

Nummer	Alter	Orbita- höhe	Orbita- breite	Verhältniss von Orbitahöhe zu Orbitabreite 100 == Orbitaindex	Refraktion
41	17 $\frac{1}{4}$	28	39	71,8	M 2,25
42	17 $\frac{1}{2}$	25	33 $\frac{1}{2}$	74,6	M 2,5
43	20	32	36	88,9	M 2,5
44	18	30 $\frac{1}{2}$	86	84,7	M 2,5
45	17 $\frac{1}{4}$	32 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$	86,7	M 3,0
46	19 $\frac{1}{2}$	30	35	85,7	M 3,0
47	17 $\frac{1}{4}$	29	38	76,3	M 3,0
48	18	30	35 $\frac{1}{2}$	84,5	M 3,0
49	18	34 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	100,0	M 3,5
50	18	33 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	97,1	M 3,5
51	17 $\frac{1}{4}$	32 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$	86,7	M 4,0
52	18 $\frac{1}{4}$	30	38	78,9	M 5,0
53	18	31 $\frac{1}{2}$	37	85,1	M 5,0
54	18 $\frac{1}{4}$	34 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$	89,6	M 5,0
55	18 $\frac{3}{4}$	32	34 $\frac{1}{2}$	92,8	M 5,0
56	17 $\frac{1}{2}$	29	33	87,8	M 5,0
57	17 $\frac{1}{2}$	30	32 $\frac{1}{2}$	92,3	M 5,0
58	17 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$	86,7	M 5,0
59	18 $\frac{1}{4}$	31	38 $\frac{1}{2}$	80,5	M 6,0
60	17 $\frac{1}{2}$	32	37 $\frac{1}{2}$	85,3	M 7,0
Gesamtmittel . . .		31,3	35,7	87,7	
Mittel d. Hypermetropen		30,5	34,5	88,4	
Mittel der Emmetropen		31,2	35,6	87,7	
Mittel der Myopen . .		31,5	35,9	87,7	

I.

Zusammenstellung der Orbitamaasse bei den verschiedenen Refraktionszuständen classenweise geordnet.

Classe	Orbitahöhe				Orbitabreite			
	bei allen Unter- suchten	bei H.	bei E.	bei M.	bei allen Unter- suchten	bei H.	bei E.	bei M.
Sexta . .	31,6	31,6	31,5	32,3	33,4	33,4	33,6	32,4
Quinta . .	32,2	32,6	32,1	32,4	33,3	33,4	33,3	33,6
Quarta . .	32,2	32,4	32,1	33,3	34,2	33,5	34,4	34,8
Unter-Tertia	31,5	31,2	31,4	33,1	32,2	32,5	32,3	31,3
Ober-Tertia	31,5	31,1	31,6	31,3	32,5	31,8	32,7	32,3
Unt.-Secunda	31,8	30,8	31,4	34,3	34,1	33,4	34,1	34,8
Ob.-Secunda	32,6	33,9	32,1	33,0	34,9	35,8	34,4	35,5
Unter-Prima	32,2	34,0	32,0	32,0	35,6	37,2	35,5	35,5
Ober-Prima	31,3	30,5	31,2	31,5	35,7	34,5	35,6	35,9

II.

Zusammenstellung der Orbitaindices bei den verschiedenen Refraktionszuständen classenweise geordnet.

Classe	Orbitaindex der Hyper- metropen	Orbitaindex der Emmetropen	Orbitaindex der Myopen	Orbitaindex sämtlicher untersuchter Augen
Sexta	94,6	94,0	99,8	94,6
Quinta	97,6	96,4	96,4	96,5
Quarta	96,8	93,3	95,8	94,9
Unter-Tertia . . .	96,2	97,5	105,6	97,9
Ober-Tertia . . .	98,0	96,9	97,0	97,0
Unter-Secunda . .	92,2	92,3	98,5	93,3
Ober-Secunda . .	94,7	93,1	93,1	93,3
Unter-Prima . . .	91,5	90,2	91,0	90,6
Ober-Prima . . .	88,4	87,7	87,7	87,7

III.

Zusammenstellung der Mittelwerte bei den verschiedenen Refraktionszuständen für sämtliche Augen.

	Orbita- höhe	Orbita- breite	Orbita- index	Zahl der Augen
Mittel sämtl. untersuchter Augen	31,9	33,9	94,1	578
Mittel sämtlich. hypermetr. Augen	31,7	33,7	94,1	392
Mittel sämtlicher emmetrop. Augen	32,1	33,5	95,9	77
Mittel sämtlicher myopisch. Augen	32,3	34,8	93,1	109

Was das zunächst inbetracht kommende Ergebnis der Untersuchung betrifft, so geht aus vorstehend mitgeteilter Zusammenstellung hervor: dass die Höhe und Breite des Orbitaeinganges nicht wesentlich verschieden gefunden wird, wenn jeweils die hypermetropischen, emmetropischen und myopischen Schüler der einzelnen Classen mit einander verglichen werden. Der Orbitaindex wird bei Myopen in der einen Classe ein wenig kleiner, in der anderen etwas grösser gefunden, als der Mittelwert für sämtliche Augen. Die Stilling'sche Anschauung, wonach der Orbitaindex bei Myopen im allgemeinen beträchtlich kleiner gefunden werde, als bei Hypermetropen und Emmetropen (nur grosse Differenzen können hier etwas beweisen!) findet somit in dem Ergebnis dieser Untersuchung keine Bestätigung.

Die in Tab. III zum Schluss gegebene Zusammenstellung über die Mittelwerte der Orbitaindices von sämtlichen untersuchten Hypermetropen, Emmetropen und Myopen, scheint im Widerspruch mit dem ebengesagten zu stehen, indem der bei den Myopen gefundene Mittelwert 93,1, bei den Hypermetropen dagegen 95,9 ist.

Dieser Widerspruch ist aber nur ein scheinbarer. Wie aus Tab. II ersichtlich ist, nimmt nämlich der Orbitaindex nach den oberen Classen hin erheblich ab, was auf ein beträchtlicheres Breitenwachstum des Gesichtes und damit der Orbita bezogen werden dürfte. In den fünf unteren Classen, d. i. vom 9. — 14. Lebensjahre, scheint die Orbita sich nicht viel zu verändern, während sie vom 14. — 19. Lebensjahre — in den 4 oberen Classen — merklich an Breite zunimmt.

Als Mittelwert der Orbitaindices der fünf unteren Classen findet man 96,2, während der der vier oberen Classen 91,2 beträgt.

Wie bekannt, und wie es auch diese Arbeit zeigt, ist die Zahl der Myopen in den unteren Classen eine sehr kleine. Sie wächst nach den oberen Classen immer mehr, in der Art, dass in der Oberprima mehr als die Hälfte der Schüler kurzsichtig ist. Im Ganzen wurden, wie in Tab. III angegeben ist, 109 myopische Augen gefunden. Von diesen 109 gehören 82 (— 75,2 %) Schüler den vier oberen Classen an, bei denen, wie eben angeführt, der Orbitaindex beträchtlich niedriger gefunden wird, als in den unteren Classen, in denen die Hypermetropen und Emmetropen beträchtlich überwiegen.

Es ist das ein sehr beachtenswerther Punkt, dessen Nichtberücksichtigung sehr leicht zu Fehlschlüssen führen muss. Da in den verschiedenen Lebensaltern die Durchschnittswerte der Orbitaindices verschieden sind, so können selbstverständlich nur Myopen mit Hypermetropen und Emmetropen gleichen Alters verglichen werden.

Werden die Schüler sämtlicher Classen je nach den Refraktionszuständen zusammengestellt, so werden bei den Hypermetropen und Emmetropen selbstverständlich die Schüler der unteren Classen bei weitem prävalieren und umgekehrt bei den Myopen die Schüler der oberen Classen. Da nun in den unteren Classen der Orbitaindex durchschnittlich erheblich grösser ist, als in den oberen, so werden die Schüler der unteren Classen mit dem grösseren Orbitaindex in der Rubrik der Hypermetropen und Emmetropen den Ausschlag geben, während umgekehrt die der Mehrzahl nach den vier oberen Classen angehörenden Myopen mit dem durchschnittlich kleineren Orbitalindex den Gesamtmittelwert der Myopen bestimmen.

Stilling sind offenbar diese physiologischen Altersverschiedenheiten beim Wachstum der Orbita entgangen.

Abgesehen von diesem Hauptpunkte ergeben sich aus einem Vergleich mit den C o h e n'schen Tabellen, dessen

Material dem unseren ähnlich ist, auch in anderer Beziehung wesentliche Differenzen.

Zunächst muss auffallen, dass bei Cohen die excessiv kleinen Werte für die Orbitahöhe (25), die bei uns nur ganz ausnahmsweise ein oder zweimal vorkommen, und die excessiv grossen für Orbitabreite (39 und mehr), sich viel häufiger finden. Auch in den Fällen, wo die Werte für Höhe und Breite nicht gerade Grenzwerte nach oben oder unten sind, sind die Differenzen zwischen Höhe und Breite durchschnittlich bei Cohen grösser. In Folge dessen hat er fast durchgehends kleinere Orbitaindices berechnet, als ich. Als Beispiel dafür möge nur Folgendes dienen:

Cohen giebt an*): „Ungefähr beim Orbitaindex 85, welcher einer Differenz der Höhen- und Breitenmaasse um 5—6 mm. entspricht, liegt die Grenze, an welcher die Orbita beginnt zur Myopie zu disponieren.“

Sehen wir nun zu, wie oft sich bei unserer Untersuchung ein Orbitaindex unter 86 findet, so stellt sich heraus, dass das bei 50 von 578 untersuchten Orbitae, also in $8,7\frac{0}{10}$ der Fall ist, wogegen die Zahl der myopischen Augen 109, das ist $18,9\frac{0}{10}$ beträgt, also mehr als noch einmal so viel. Dazu kommt noch, dass nur bei 19 — $3,8\frac{0}{10}$ von den 50 Orbitae mit kleinerem Index als 86 myopische, dagegen bei 31 — $62\frac{0}{10}$ hypermetropische und emmetropische Refraktion vorhanden ist. Es haben also von den 109 myopischen Augen nur 19, das ist $17,4\frac{0}{10}$ einen Index unter 86.

Diese Zahlen sprechen so deutlich gegen die Richtigkeit der Cohen'schen Behauptung, dass jede weitere Erörterung überflüssig sein dürfte.

Um den Beweis, dass die Stilling-Cohen'sche Ansicht nicht richtig ist, auch positiv zu führen, sei noch Folgendes

*) O. Cohen: Ueber die Gestalt der Orbita bei Kurzsichtigkeit im Archiv für Augenheilkunde von Knapp und Schweiger. XIX. Band, Heft I. S. 54.

erwähnt: Orbitaindices von 100,0 und höher fanden sich bei uns in 116 Fällen, das ist in 20,1% von sämtlichen untersuchten Augen. Bei Myopen findet sich ein Index von über 100,0 in 22 von 109 Fällen, also in 21,8%, bei Emmetropen und Hypermetropen in 94 Fällen, id est in 20,1% sämtlicher emmetropischen und hypermetropischen Augen. Also eine Augenhöhle, die so hoch als breit, oder sogar höher als breit ist, findet sich bei einem allerdings nur sehr wenig grösseren Procentsatz von myopischen, als von emmetropischen und hypermetropischen Augen. Für die einzelnen Classen stellt sich das Verhältnis ähnlich.

Niederste Indices zwischen 71,0 und 80,0 finden sich bei uns nur in 11 Fällen, davon 6 bei den Myopen der Ober-Prima, 4 bei den Emmetropen dieser Classe und 1 bei den Myopen der unteren Classen.

Auch dieses Verhalten spricht nicht für die Stilling'sche Theorie. Erwähnt soll auch noch werden, dass die nicht wenigen Fälle von Anisometropie, die zur Messung kamen, im Grossen und Ganzen das von Weiss darüber Gesagte bestätigen. Dieser wird hierüber an anderem Orte ausführlicher berichten.

Schliesslich darf nicht unerwähnt bleiben, dass Messungen, welche in letzter Zeit in der Augenklinik in München an Erwachsenen vorgenommen wurden, Resultate ergaben, die den Stilling'schen ziemlich nahe kommen.

Zum Teil ist diese Differenz in dem erhaltenen Resultat durch die Verschiedenheit des Untersuchungsmaterials in Bezug auf's Alter bedingt, indem die Form der Orbita beim Kind und beim Erwachsenen — es geht dies aus vorstehender Zusammenstellung hervor — eine verschiedene ist; zum Teil dürfte sie vielleicht auch durch anderweitige Verhältnisse bedingt sein, die erst noch festgestellt werden müssen. Mit allem Vorbehalt sei mit Bezug hierauf darauf hingewiesen, dass bei den untersuchten Schülern des Mannheimer Gymnasiums ver-

hältnissmässig sehr viel Israeliten waren, was möglicherweise von Einfluss ist.

Stets wird man mit den Schlussfolgerungen einer noch so exact ausgeführten statistischen Untersuchung äusserst vorsichtig sein müssen.

Was das Ergebnis der vorstehend mitgeteilten Untersuchungen betrifft, so lässt sich dieses in Kürze folgendermassen formulieren:

- 1) die Stilling'sche Behauptung, dass ein niederer Orbitaindex zur Myopie disponiere, findet in den mitgeteilten Messungswerten keine Bestätigung, auch dann nicht, wenn nur die oberen Classen berücksichtigt werden. Dass die in den unteren Classen gefundenen Messungswerte für die in Rede stehende Frage nicht inbetracht kommen, weil hier noch viele Hypermetropen sind, welche später myopisch werden, ist oben bereits erwähnt worden. Auf die Bedeutung des Befundes in den Mittelclassen wurde oben bereits gleichfalls schon hingewiesen.
- 2) Die Orbita verändert in der Zeit des grössten Körperwachstums ihre Höhe nur wenig — mit 9 Jahren ist sie annähernd so hoch als mit 20 (cfr. T. I u. II) — während vom 14. bis 20. Lebensjahre ein beträchtliches Wachstum in die Breite stattfindet.

Am Schlusse dieser Arbeit bleibt mir noch die angenehme Pflicht, Herrn Dr. Leopold Weiss, der den Gedanken zu ihrer Anfertigung in mir anregte, meinen wärmsten Dank auszusprechen. Ohne seine Anleitung und seine Hilfe mit Rat und That, wäre es mir nicht möglich gewesen, in verhältnissmässig kurzer Zeit so umfangreiche Untersuchungen anzustellen.

Auch meinem verehrten ehemaligen Lehrer, Herrn Gymnasial-Director Professor Ferdinand Haug in Mannheim, bin ich zu grossem Dank verpflichtet, dafür, dass er in entgegenkommendster Weise mir jeweils die Schüler der Classen, die ich gerade brauchte, zur Verfügung stellte.
